

NAZWA PRODUKTU

D6_tds0247_Poduszka pod kark

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją i sprawdź stan produktu pod kątem uszkodzeń.
- ☐ Upewnij się, że powierzchnia, na której używasz poduszki, jest stabilna i równa.
- ☐ Nie stosuj nadmiernej siły przy układaniu się na poduszcze – może to wpłynąć negatywnie na działanie produktu.
- ☐ Unikaj stosowania poduszki w miejscach wilgotnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.
- ☐ Nie używaj produktu, jeśli odczuwasz silny ból, zawroty głowy lub inne niepokojące objawy.
- ☐ Regularnie czyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować jego higieniczność.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Poduszkę należy stosować w pozycji leżącej, umieszczając ją pod karkiem, tak aby jej krzywizna wspierała naturalny łuk szyi.
- ☐ Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się używanie 2–3 razy dziennie przez 4–5 minut.
- ☐ Produkt można także stosować dłużej, jeśli nie powoduje dyskomfortu – możliwe jest nawet stosowanie podczas snu.
- ☐ W trakcie użytkowania staraj się pozostać nieruchomo i zrelaksowany, oddychając głęboko.
- ☐ Regularne stosowanie może wspomóc poprawę postawy, złagodzić napięcia mięśniowe i zmniejszyć częstotliwość bólów głowy.
- ☐ Produkt najlepiej sprawdza się jako element codziennej profilaktyki – nie powinien być traktowany jako zamiennik leczenia medycznego

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby z poważnymi schorzeniami kręgosłupa szyjnego, urazami w odcinku szyjnym lub po przebytych operacjach bez konsultacji z lekarzem.
- ☐ Nie zaleca się stosowania u dzieci oraz osób z ograniczoną kontrolą ruchową bez nadzoru.
- ☐ Unikaj stosowania produktu w trakcie ostrych stanów zapalnych, infekcji, gorączki lub obrzęków w obrębie szyi.
- ☐ Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu, pracy czy innych czynności wymagających pełnej koncentracji.
- ☐ Nie stosować jednocześnie z maściami rozgrzewającymi lub chłodzącymi, które mogą wchodzić w reakcję z materiałem poduszki.
- ☐ W przypadku nasilenia się dolegliwości bólowych, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.