

NAZWA PRODUKTU

D11_tds0239_Szczoteczka żółta

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

-  Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zdezynfekować szczoteczkę poprzez przelanie końcówki wrzątkiem.
-  Po każdym użyciu szczoteczkę należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia w suchym, przewiewnym miejscu.
-  Regularnie kontroluj stan szczoteczki – w przypadku uszkodzeń, pęknięć lub deformacji wymień ją na nową.
-  Unikaj przechowywania szczoteczki w zamkniętych, wilgotnych pojemnikach, co może sprzyjać rozwojowi pleśni i bakterii.
-  Produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zalecane jest używanie szczoteczki z pastą w piance. Przy zastosowaniu tradycyjnej pasty należy ją wcześniej rozcieńczyć wodą.
- Szczotkowanie powinno trwać około 60 sekund.
- Podczas szczotkowania należy wykonywać delikatne ruchy w lewo i prawo, aby zapewnić dokładne oczyszczenie całej powierzchni zębów.
- Utrzymuj szczoteczkę pod kątem około 45 stopni względem uzębienia dziecka.
- Produkt najlepiej sprawdza się u dzieci w wieku od 2 do 12 lat, w zależności od rozmiaru szczęki.
- Aby uniknąć deformacji materiału, nie należy gotować szczoteczki ani wkładać jej do mikrofalówki.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ? Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.
- ? Produkt nie powinien być używany przez dzieci z wadami rozwojowymi jamy ustnej bez wcześniejszej konsultacji z dentystą.
- ? Nie należy pozwalać dziecku na żucie lub gryzienie końcówki szczoteczki, ponieważ może dojść do uszkodzenia struktury silikonowej.
 - ? Produkt nie zastępuje regularnych wizyt kontrolnych u stomatologa.
- ? Szczoteczka nie powinna być dzielona pomiędzy różnymi dziećmi ze względów higienicznych.
- ? Nie stosować, jeśli dziecko ma otwarte rany, owrzodzenia lub stany zapalne w jamie ustnej.