

NAZWA PRODUKTU

Cx3_tds0022_szczoteczka 360 Niebieska

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przepłukać szczoteczkę wrzątkiem.
- ☐ Regularnie myć szczoteczkę po każdym użyciu pod bieżącą wodą.
- ☐ Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji umożliwiającej jej całkowite wyschnięcie.
- ☐ Nie stosować uszkodzonej lub zdeformowanej szczoteczki – w takim przypadku należy ją niezwłocznie wymienić.
- ☐ Szczoteczka powinna być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- ☐ Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami, otwartym ogniem oraz agresywnymi środkami chemicznymi.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Zalecane jest używanie pasty piankowej lub rozcieńczonej pasty klasycznej.
- ☐ Włóż końcówkę szczoteczki do ust dziecka, delikatnie zamknij usta i wykonuj ruchy w lewo i prawo przez około 60 sekund.
- ☐ Szczotkowanie można podzielić na górne i dolne partie zębów, wykonując osobno dla każdej sekcji ruchy czyszczące.
- ☐ Utrzymuj szczoteczkę pod kątem 45 stopni względem zębów dla dokładniejszego efektu.
- ☐ Po użyciu dokładnie opłucz szczoteczkę i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- ☐ Zalecana częstotliwość wymiany szczoteczki: co 2–3 miesiące lub wcześniej, jeśli zauważalne są oznaki zużycia.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt przeznaczony wyłącznie do higieny jamy ustnej dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
- Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia bez konsultacji z lekarzem pediatrą lub stomatologiem.
- Nie używać jako zabawki – produkt nie nadaje się do żucia ani gryzienia poza kontrolowanym szczotkowaniem.
- Nie stosować past zawierających silne środki ściernie lub alkohole, które mogą uszkodzić powierzchnię szczoteczki.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnień dziąseł, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.