

NAZWA PRODUKTU

a12_Y86 Opaska na nadgarstek czarna

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem sprawdź stan stabilizatora, aby wykluczyć uszkodzenia lub zużycie materiału.
- Upewnij się, że stabilizator jest odpowiednio dopasowany i nie powoduje ucisku utrudniającego krążenie krwi.
- Nie stosuj stabilizatora na otwarte rany, podrażnioną lub zakażoną skórę.
- Unikaj noszenia stabilizatora przez długi czas bez przerw, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi i ograniczeniu ruchomości.
- W przypadku wystąpienia bólu, drętwienia lub obrzęku przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Załóż stabilizator na suchą i czystą skórę, upewniając się, że otwór na kciuk jest prawidłowo umieszczony.
- ☐ Dopasuj samoprzylepną taśmę, aby zapewnić komfortowe i stabilne utrzymanie nadgarstka.
- ☐ Stosuj stabilizator podczas aktywności fizycznej lub czynności obciążających nadgarstek, aby zwiększyć jego ochronę i wsparcie.
- ☐ Po zakończeniu użytkowania zdejmij stabilizator i pozwól skórze odpocząć.
- ☐ Przechowuj stabilizator w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używaj stabilizatora jako zamiennika profesjonalnej opieki medycznej w przypadku poważnych urazów nadgarstka.
- Unikaj stosowania stabilizatora, jeśli masz alergię na materiały, z których jest wykonany (nylon, guma).
- Nie stosuj stabilizatora, jeśli występują objawy zakażenia skóry lub stan zapalny w okolicy nadgarstka.
- Nie używaj stabilizatora podczas snu ani przez dłuższy czas bez konsultacji ze specjalistą.
- W przypadku pogorszenia się dolegliwości bólowych lub innych niepokojących objawów, przerwij stosowanie i zasięgnij porady lekarza.