

NAZWA PRODUKTU

tds0252_Nakładki silikonowe na pięty

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem zaleca się wykonanie testu na małym fragmencie skóry, aby wykluczyć reakcje alergiczne.
- Unikaj stosowania skarpetek na otwarte rany lub świeże skaleczenia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz podrażnienia, zaczerwienienia lub pieczenie skóry podczas stosowania.
- Przechowuj skarpetki w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Po użyciu dokładnie umyj i wysusz skarpetki przed kolejnym zastosowaniem.
- Nie stosuj jednocześnie z produktami zawierającymi substancje mogące uszkodzić silikon, np. oleje mineralne lub rozpuszczalniki.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed założeniem skarpetek dokładnie umyj i osusz stopy.
- ☐ W przypadku mocno zrogowaciałej skóry zaleca się wcześniejsze usunięcie martwego naskórka tarką lub pumeksem.
- ☐ Nałóż grubą warstwę odpowiedniego kremu lub maści regenerującej na pięty przed założeniem skarpetek.
- ☐ Skarpetki najlepiej stosować na noc, aby zapewnić długotrwałe działanie regenerujące.
- ☐ Produkt można prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym mydłem, a następnie suszyć naturalnie, nie wykręcając.
- ☐ Regularne stosowanie zwiększa skuteczność regeneracji skóry pięt i zapobiega powstawaniu nowych pęknięć.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u osób z uczuleniem na silikon lub inne materiały użyte w produkcie.
- Nie nakładać na otwarte rany, zakażenia skóry lub stany zapalne.
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia poważnych schorzeń skóry – w przypadku głębokich pęknięć lub silnego bólu należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać jako zamiennik zaleconego leczenia dermatologicznego.
- Nie stosować u dzieci bez konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych przerwać używanie i zasięgnąć porady specjalisty.