

NAZWA PRODUKTU

C00_tds0679_Taśma kompresyjna CZARNA

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed rozpoczęciem użytkowania opaski skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli masz istniejące schorzenia stawu kolanowego, problemy z krążeniem lub wątpliwości co do stosowania produktu.
- ☐ Nie stosuj opaski bezpośrednio na rany, otwarte skaleczenia, podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
- ☐ Unikaj nadmiernego zaciskania opaski – zbyt mocna kompresja może ograniczać przepływ krwi i prowadzić do dyskomfortu lub powikłań.
- ☐ Nie używaj opaski w nocy ani podczas długiego odpoczynku bez konsultacji ze specjalistą.
- ☐ Nie ekspozuj opaski na działanie wysokiej wilgotności przez długi czas, np. pod prysznicem lub w saunie.
- ☐ Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie zastępuje profesjonalnej diagnozy ani leczenia.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Opaskę zakładaj zgodnie z zaleceniami producenta, dopasowując kompresję indywidualnie do swoich potrzeb i odczuć komfortu.
- ☐ Przed założeniem upewnij się, że opaska jest czysta i sucha.
- ☐ Stosuj opaskę podczas codziennych aktywności lub rehabilitacji jako wsparcie i stabilizację stawu kolanowego.
- ☐ Po użyciu zapnij rzep, aby zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniem i ułatwić przechowywanie.
- ☐ Regularnie czyść opaskę ręcznie w temperaturze do 30°C, unikając detergentów, wybielaczy i środków zmiękczających. Susz na płasko, bez użycia suszarki i prasowania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj opaski jako substytutu leczenia ortopedycznego lub rehabilitacji zaleconej przez lekarza.
- Nie używaj produktu w przypadku poważnych uszkodzeń skóry lub aktywnych stanów zapalnych w miejscu zakładania.
- Unikaj stosowania w przypadku chorób układu krążenia, które mogą być przeciwwskazaniem do stosowania ucisku, jeśli nie zostało to skonsultowane z lekarzem.
- Nie stosuj opaski, jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub inne niepokojące objawy podczas użytkowania.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci bez nadzoru osoby dorosłej i konsultacji lekarskiej..